



Journées de l'ANPCME 2021


Strasbourg 15 au 17 septembre

Les vagues successives

Cas et mortalité a l'Espagne


How trends have changed in Spain

New reported cases by day



► About this data

New reported deaths by day



► These are days with a reporting anomaly. Read more [here](#).

Situation actuelle

- Occupation UCI <20%
- Dispositifs extraordinaires interns et ext. (centres add., hotels,...) fermés.
- Vistes telemàtiques, visites hôp. limitées
- Restrictions (masque, occupation locaux, “Nuit fermé”).
- Risque associé au Tourisme et Jeunesse

Derrières 14 jours

- Cas x jour: 9/100K
- Change: <51%
- Mortalité: 0,18/100K



Vaccination

- La population est déterminée à se vacciner
- 79% une dose/ 74% complet (12 sept)
- Julliet:
 - Vaccination des jeunes
 - Placement de points vaccination sans cité
- Patients esquizofréniques priorisées

Association of Psychiatric Disorders With Mortality Among Patients With COVID-19

Katlyn Nemani, MD; Chenxiang Li, PhD; Mark Olfson, MD, MPH; Esther M. Blessing, MD, PhD;
Narges Razavian, PhD; Ji Chen, MS; Eva Petkova, PhD; Donald C. Goff, MD

JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.4442
Published online January 27, 2021.

Association between mental illness and COVID-19 susceptibility and clinical outcomes in South Korea: a nationwide cohort study

Seung Won Lee*, Jee Myung Yang*, Sung Yong Moon, In Kyung Yoo, Eun Kyo Ha, So Young Kim, Un Min Park, Sejin Choi, Sang-Hyuk Lee, Yong Min Ahn, Jae-Min Kim, Hyun Yong Koh*, Dong Keon Yon

the lancet.com/psychiatry Vol 7 December 2020

COVID-19 Prevalence and Mortality Among Schizophrenia Patients: A Large-Scale Retrospective Cohort Study

Dana Tzur Bitan^{*,1,2}, Israel Krieger², Khalaf Kridin³, Doron Komantscher⁴, Yochai Scheinman⁴, Orly Weinstein^{4,5}, Arnon Dov Cohen^{4,6}, Assi Albert Cicurel^{7,8}, and Daniel Feingold¹

Schizophrenia Bulletin doi:10.1093/schbul/sbab012


Covid-19, hipercoagulabilidad y riesgo de mortalidad en esquizofrenia

Carles Garcia-Ribera^{1,3}
Marina Carrasco²
Ada Ruiz-Ripoll³

Actas Esp Psiquiatr 2021;49(4):194-195 | ISSN: 1578-2735

Facteurs associés au Risque Tromboembolique

- Covid
- Schizofrénie
- Antipsychotiques




Impact du Covid (1) sur Santé Mental des Travailleurs Santé

- Observationel
- 9138 participants (12,5%)
- screening positive: probable trouble 45%
 - 28,1% MDD (T de l'humeur depresive)
 - 22,5% GAD (T angoise)
 - 24% PanicD
 - 22,2% (PTSD) T Post-traumàtique
 - 6,2% SUD
- Ceux avec **antecedents**: x2 risque
- Ceux front **Covid full-time (x5,19), quarantinés ou isolées, femmes, jeunes.**

Conduite (et ideation) Suicidaire


- Population general
- n:3500
- Prevalence-mois 4,5%
 - **Antecedents**
 - **Manque de support social**
 - **Stress interpersonal**
 - **Stress associé a la maladie**
- Personnel hospitalier
- n:5450
- Prevalence-mois 8,4%
 - 2,7% ideation, n:6 tentative
 - **Antecedents**
 - **Manque de communication, id. personnel**
 - **Stress financier**



© AITOR PEDRUEZA
EL GIGOSCOPO VENJERO

620eme anniversaire

- Hospital de la Santa Creu 1401




- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 1916/1930
- Institut Mental de la Santa Creu 1889-1987
- *Nouveau* Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2009



SANT PAU

The Countries With The Most Critical Care Beds Per Capita


Total number of critical care beds per 100,000 inhabitants in selected countries*



* Most recent U.S. and EU data from 2009 and 2012 respectively.
Asian data is from 2017.

Sources: National Center for Biotechnology Information, Intensive Care Medicine (journal), Critical Care Medicine (journal)





Les vagues successives

Cas et mortalité a l'Espagne

